

## EK-1. ANNE DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

ANNE DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ		
Tarih:		
Hastanın Adı Soyadı:		
Yaşı		
Yattığı Bölüm		
Risk Değerlendirme Tarihi:		
Parametreler	Risk Faktörleri	Puan
TIBBİ ÖYKÜSÜ	Epilepsi Nöbeti	10
	Hamilelikte Uzun Süreli Yatağa Bağımlılık (1 haftadan daha fazla)	9
DUYUSAL ALGI	Görme Bozukluğu	5
	Bilinç Bozukluğu	3
	Baş Dönmesi, Baş Ağrısı	5
DOĞUM İLE İLGİLİ KOŞULLAR	Anemi	2
	Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon	2
	Preeklampsi	2
	Eklampsi	3
	Doğum Sonrası Kanama (Doğumdan 24 saat sonra > 500 ml kanama)	3
	Uzamış Doğum Eylemi	2
	Doğumdan Sonra Gıda Alımının Olmaması (6 saatten fazla)	2
HAREKET	Yürüme Engelinin Varlığı, Yardımcı Cihaz Kullanımı	9
İLAÇ KULLANIMI	Sedatif Kullanımı	4
	Antihipertansif İlaçların Kullanımı	3
	Hipoglisemik İlaçların Kullanımı	3
	Uyuşukluğa Neden Olan İlaçların Kullanımı	4
<b>TOPLAM</b>		
RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU		
Düşük Risk	0-6,5 Puan Arasında	
Yüksek Risk	6,5 Puan Üzerinde	

Kaynak; Min X, Wenliang T, Qiwei L, Shouzhen C, (2017). Design, application and evaluation of maternal fall risk assessment scale. Biomedical Research, 28 (3), p.315-1320 (Çeviri).