

## 1. Başvuru Anında

### Annenin sevki gerekiyor mu?

- Hayır
- Evet, planlandı

Birim kriterlerini kontrol edin.

### Partograf başlatıldı mı?

- Hayır, 4 cm ve üstünde başlayacak
- Evet

Serviks  $\geq$  4 cm iken işaretlemeye başlayınız, serviks her 1 saatte en az 1cm genişlemelidir.  
◦ Her 30 dk: Kalp atışı, kontraksiyonlar, fetal kalp atışı  
◦ Her 2 saat: Vücut sıcaklığı  
◦ Her 4 saat: Kan basıncını kaydedin.

### Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

#### Antibiyotik?

- Hayır
- Evet, verildi

Şu durumlarda anneye antibiyotik veriniz:  
◦ Vücut sıcaklığının  $>$  38oC ise  
◦ Kötü kokulu vajinal akıntının varsa  
◦ Amniyon kesesi yırtılmasının sonrasında 18 saat geçti ise

#### Magnezyum sülfat?

- Hayır
- Evet, verildi

Şu durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz:  
◦ Diastolik kan basıncının 110mmHg ve üzeri ve proteinürinin 3 ve üstü,  
◦ Diastolik kan basıncının 90mmHg ve üzeri ve proteinürinin 2 ve üstü, şiddetli baş ağrısı, görüs bozukluğu, epigastirik ağrı

#### Anti-retroviral?

- Hayır, HIV negatiflik onaylandı
- Evet, verildi
- Durum bilinmiyor, HIV testi istendi

◦ CD4 değeri 350 veya daha küçük olan veya klinik tanı tedavi gerektiriyorsa verilir.  
◦ CD4 değeri 350'nin üstünde olan annelerde profilaksi amacıyla verilir.

- Her vajinal muayenede el hijyeni ve eldiven kullanımı için yeterli malzeme mevcut

- Refakatçi doğumda bulunması için teşvik edildi

- Anne veya refakatçinin doğumda tehlikeli bir durum karşısında yardım çağıracağı onaylandı

## 2. Doğumdan Önce (veya Sezaryenden önce)

### Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

#### Antibiyotik?

- Hayır
- Evet, verildi

Şu durumlarda anneye antibiyotik veriniz:

- Vücut sıcaklığının  $>$  38oC ise
- Kötü kokulu vajinal akıntının varsa
- Amniyon kesesi yırtılmasının sonrasında 18 saat geçti ise

#### Magnezyum sülfat?

- Hayır
- Evet, verildi

Şu durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz:

- Diastolik kan basıncının 110mmHg ve üzeri ve proteinürinin 3 ve üstü,
- Diastolik kan basıncının 90mmHg ve üzeri ve proteinürinin 2 ve üstü, şiddetli baş ağrısı, görüs bozukluğu, epigastirik ağrı

### Gerekli malzemelerin hasta yatağı yanında kullanıma hazır olması:

#### Anne için:

- Eldiven
- Sabun ve temiz su
- 10IU enjektörde oksitosin

Anne bakımına doğumun hemen sonrasında hazır olun.

- Bebeği ayırın,
- Oksitosini anneye ilk dakika içinde uygulayın
- Plasentanın çıkışı için göbek bağının gerilmesini kontrol edin ve çıkış sonrası uterusu masaj yapın.

#### Bebek için:

- Temiz havlu
- Göbek bağının kesilmesi için steril bıçak
- Aspirasyon cihazı
- Ambu

Bebek bakımına doğumun hemen sonrasında hazır olun.

- Bebeği kurulaştırın ve sıcak tutun,
- Eğer nefes almıyorsa uyarın ve hava yolunu temizleyin.
- Nefes almama devam ediyorsa göbek bağını kesin, ambu setiyle ventilasyona başlayın.
- Yardım isteyin.

### Gerektiği durumda doğuma yardım etmesi için asistan tanımlanıp ilgili kişi bilgilendirildi mi?

- Hayır
- Evet

## 3. Doğumdan hemen sonra (İlk 1 saat içinde)

### Annede anormal kanama var mı?

- Hayır  
 Evet, yardım çağrıldı

Kanamanın 500ml üstü olduğu veya kanamanın 250ml üstü ve annede aneminin mevcut olduğu durumlarda:

- Uterus'a masaj uygulayın
- İlave uterotonikleri dikkate alın,
- IV damar yolu açın,
- Tedaviye başlayın.

### Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

#### Antibiyotik?

- Hayır  
 Evet, verildi

Plasentanın manuel olarak çıkarıldığı ve vücut sıcaklığının 38°C üzerinde olduğu, üşüme, kötü kokulu vajinal akıntı durumlarında anneye antibiyotik veriniz.

#### Magnezyum sülfat?

- Hayır  
 Evet, verildi

Şu durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz:

- Diastolik kan basıncının 110mmHg ve üzeri ve proteinürinin 3 ve üstü,
- Diastolik kan basıncının 90mmHg ve üzeri ve proteinürinin 2 ve üstü, şiddetli baş ağrısı, görüs bozukluğu, epigastirik ağrı

### Bebeğin sevgi gerekiyor mu?

- Hayır  Evet, planlandı

Birim kriterlerini kontrol edin.

### Bebek için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

#### Antibiyotik?

- Hayır  
 Evet, verildi

• Anneye antibiyotik uygulamasının yapıldığı,  
• Solunumun çok hızlı(dakikada 60 üstü) veya çok düşük(dakikada 30 altında) olduğu,  
• Göğüste hırıltı sesinin, konvülsiyonların olduğu,  
• Hareket veya uyarının görüldüğü durumlarda,  
• Vücut sıcaklığı ısıtma sonrasında 35°C'nin üstüne çıkmıyorsa veya 38°C'nin üstündeyse antibiyotik veriniz.

#### Antiretroviral?

- Hayır  
 Evet, verildi

Annenin HIV+ olduğu durumda antiretroviral veriniz.

### Bebeğin özel bakım veya takibe ihtiyacı var mı?

- Hayır  Evet, planlandı

Bebeğin normal süreden 1 aydan fazla süre erken doğduğu, doğum ağırlığının 2500 gramdan az olduğu, antibiyotik kullanımının gerektiği, resüsitasyona ihtiyaç duyulan durumlarda takip ediniz.

- Emzirme ve cilt temasına başlandı (Anne ve bebeğin sağlık durumları iyiyse)

- Anne veya refakatçinin doğumda tehlikeli bir durum karşısında yardım çağıracağı onaylandı

Annenin kanama, ciddi abdominal ağrı, şiddetli baş ağrısı, görüs bozukluğu, nefes almada güçlük, ateş, titreme veya defekasyonda güçlük durumlarında, Bebeğin hızlı veya zor nefes alması, ateş, normal dışı soğukluk, beslenmeyi kesmesi, hareketlerde azalma veya tüm vücudun sarı olduğu durumlarda.

## 4. Taburculuk öncesinde

### Annenin kanaması kontrol altına alındı mı?

- Hayır (Tedavi edin ve taburcuğu erteleyin.)  
 Evet

### Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

#### Antibiyotik?

- Hayır  
 Evet, (ilaç verin ve taburcuğu erteleyin.)

Vücut sıcaklığının 38°C üzerinde olduğu, üşüme, kötü kokulu vajinal akıntı durumlarında anneye antibiyotik veriniz.

### Bebek için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

#### Antibiyotik?

- Hayır  
 Evet: antibiyotik verin, taburcuğu erteleyin, özel bakım sağlayın.

• Solunumun çok hızlı(dakikada 60 üstü) veya çok düşük(dakikada 30 altında) olduğu,  
• Göğüste hırıltı sesinin, konvülsiyonların olduğu,  
• Hareket veya uyarana cevap verilmeyen durumlarda,  
• Vücut sıcaklığı ısıtma sonrasında 35°C'nin üstüne çıkmıyorsa veya 38°C'nin üstünde olduğu,  
• Emmeyi kestiği,  
• Göbek bağının çevresinin cilde doğru kırmızılaşması durumlarında bebeğe antibiyotik veriniz.

### Bebek iyi besleniyor mu?

- Evet  
 Hayır (Yardım edin ve taburcuğu erteleyin.)

### Anneye aile planlama seçeneklerinin sunulması gerekiyor mu?

- Evet, bilgilendirme yapıldı  
 Hayır

### Doğum sonrası için takip ayarlanması gerekiyor mu?

- Evet, planlama yapıldı  
 Hayır

### Anne veya refakatçisi yardım çağırması gerektiği durumlar konusunda bilgilendirildi mi?

- Evet, planlama yapıldı  
 Hayır

Annenin kanama, ciddi abdominal ağrı, şiddetli baş ağrısı, görüs bozukluğu, nefes almada güçlük, ateş, titreme veya defekasyonda güçlük durumlarında, Bebeğin hızlı veya zor nefes alması, ateş, normal dışı soğukluk, beslenmeyi kesmesi, hareketlerde azalma veya tüm vücudun sarı olduğu durumlarda.